

Кабачки и патиссоны

Кабачки и патиссоны представляют из себя вид мелко-плодной тыквы. В отличие от тыкв кабачки и патиссоны имеют кустовую форму и лишены плетей.

Кабачки и патиссоны очень скороспелые растения: при посадке семенами они дают первый сбор плодов на 50—60 день, при посадке рассадой — на 20—25 день.

В пищу идут молодые, 10—15-дневные завязи, которые легко могут заменить недостающий в летний период картофель.

Плоды кабачков и патиссонов употребляются в вареном, жареном, фаршированном, маринованном и соленом видах.

Агротехника кабачков и патиссонов очень проста и мало отличается от возделывания других овощных культур. К достоинству названных культур надо отнести небольшое количество семян, требующихся для посева, а также редкое размещение их на площади, что дает возможность сплошное удобрение и уход заменить местным удобрением и индивидуальным уходом за каждым кустом в отдельности.

В условиях Ивановской области, как показывают наблюдения Ивановского сельскохозяйственного института, подсобных хозяйств фабрики им. Дзержинского и городской больницы, кабачки и патиссоны дают урожай 200—300 ц с 1 га при трех-четыре-х сборах плодов.

АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАБАЧКОВ И ПАТИССОНОВ

Выбор участка и место в севообороте. Кабачки и патиссоны следует возделывать на открытых, хорошо прогреваемых площадях. Лучше всего их размещать на южных склонах.

Кабачки и патиссоны лучше всего возделывать на хорошо заправленных огородных участках, но они также неплохо удаются и в полевых условиях при соответствующем удобрении почвы.

Наиболее подходящими для них будут супесчаные, богатые перегноем почвы. Тяжелые, холодные, легко заплывающие, кислые почвы под кабачки и патиссоны непригодны.

В севообороте кабачки и патиссоны следует помещать



94-7110

второй культурой после хорошо удобренных навозом предшественников.

Обработка почвы. Кабачки и патиссоны очень отзывчивы на хорошую и глубокую обработку почвы.

Основную обработку почвы следует начинать с осенней зяблевой вспашки (на 18—20 см). Если кабачки и патиссоны будут идти после зерновых, то перед зяблевой пахотой необходимо провести лущение на 4—5 см.

Рано весной вспаханный на зябь участок нужно пробороновать. После боронования участок следует прокультивировать на 12—14 см и снова забороновать.

Тяжелые заплывающие почвы вместо культивации следует перепахать и тоже забороновать.

На индивидуальных огородах обработка почвы также должна быть начата с осени. Осенью участок вскапывается лопатой, как можно глубже. Рано весной его разрыхляют железными граблями и затем перед посевом опять перекапывают лопатой.

Удобрения. Удобрения являются залогом успеха культуры кабачков и патиссонов. Для удобрений почвы под кабачки и патиссоны прежде всего надо использовать местные удобрения, как-то: навоз, торф, торфяные компосты, птичий помет и золу.

Навоз и другие органические удобрения лучше вносить с осени под зяблевую вспашку. На тяжелых, холодных, легко заплывающих почвах навоз и другие органические удобрения следует вносить весной под перепахку.

Навоз и торфо-навозный или фекальный компосты вносятся в количестве от 30 до 40 т на 1 га.

Из минеральных удобрений в первую очередь следует вносить суперфосфат, который способствует повышению сахаристости и получению более раннего урожая плодов.

Из других минеральных удобрений можно применять калийные и азотные удобрения.

Суперфосфат вносят — 2—4 ц на 1 га, калийную соль — 1—2 ц, азотные удобрения — от 1 до 2 ц на 1 га.

Для экономии минеральных и органических удобрений их можно вносить под каждый куст. При этом общий расход удобрения снизится в три-четыре раза.

Посев. Кабачки и патиссоны можно возделывать семенами и рассадой.

Посев кабачков и патиссонов производят после окончания весенних заморозков.

Дружные всходы появляются при температуре почвы в 12—16°. Такие условия в Ивановской области совпадают с началом июня месяца.

Перед посевом семена следует намочить в воде в течение 8—12 часов. Хороший результат получается при посеве пророщенными семенами — для этого семена намачиваются в воде и затем выдерживаются два-три дня на влажной подстилке, в теплом месте.

В условиях сухой весны и при возможном возврате холодов посев лучше производить сухими семенами.

Для посева следует брать семена двух-трехлетнего возраста; хорошие результаты получаются при посеве так же однолетними семенами после их предварительного подсушивания.

Посев проводят на ровной поверхности с междурядием, в зависимости от плодородия почвы, на 60—80 см. (при этом семена в рядке размещают на расстоянии от 50 до 75 см).

Для правильного размещения растений на площади участок до посева следует размаркеровать в продольном и поперечном направлениях.

Посев производится в лунки, которые делаются в местах пересечения маркером. Для страховки в каждую лунку или через лунку следует класть по два семечка с тем, чтобы лишние растения использовать для посадки в местах их выпадения.

При местном внесении удобрений в лунку перед посадкой кладут навоз или другие удобрения и смешивают их с землей. В приготовленную таким образом лунку высевают семена.

Семена при посадке в лунку заделывают на глубину 3—4 см. Заделку лучше производить не землей из лунки, а перегноем или торфяной крошкой.

Выращивание рассады. Для раннего получения плодов кабачки и патиссоны нужно возделывать рассадой. При высадке рассады в грунт в начале июня — первый сбор плодов может быть уже произведен в первых числах июля, т. е. через 20—25 дней.

Рассаду кабачков и патиссонов готовят в парниках, ее также можно вырастить для индивидуального огорода в ящиках подобно томатам.

В парниках рассада выращивается в грунту или, что еще лучше, в торфяно-перегнойных горшках (2 части торфа и 1 часть дерновой, перепревшей земли).

Посев рассады производится за 30—40 дней до высадки в грунт. Для выращивания рассады кабачков и патиссонов надо брать рыхлую, хорошо пропускающую воду землю. Лучшим составом для них будет — 60% суглинистой дерновой земли и 40% перегноя.

Семена под рамой размещаются в 25—30 рядов на 5—6 см друг от друга. Всего на раму идет 15 г семян.

Горшки устанавливаются вплотную без просвета в теплом парнике или на стелажках рассадной теплицы.

Парники должны хорошо пропускать свет, иначе рассада будет сильно тянуться. Для предупреждения вытягивания рассады в горшках семена надо высевать в почву, насыпанную до половины горшка, с тем, чтобы по мере вытягивания подсыпать до верхнего уровня.

Перед высадкой рассады в грунт ее закаливают, снимая рамы сначала на день, а затем и на ночь.

Рассаду следует вынимать осторожно, не повреждая корней. Для лучшего приживания ее в грунте нужно при посадке часть листьев удалять, не повреждая сердечка.

Посадку в грунт производят после окончания заморозков в глубокие лунки. При посадке делается поливка водой, которая должна быть повторена через два-три дня.

Уход. Всходы кабачков и патиссонов появляются на 8—10-й день. При образовании корки до всходов ее следует разбить бороной. При образовании корки на всходах она может быть уничтожена путем рыхления вокруг растения лопатками или кошками.

Первое рыхление проводят через 5—6 дней после всходов, второе — спустя 15—20 дней после первого. В течение лета рыхление повторять по мере образования корки и сорняков.

Одновременно с первым рыхлением производят выдергивание лишних растений в лунках и подсадку их в места выпада.

Уборка. Кабачки и патиссоны плодоносят подобно огурцам до самой осени, поэтому сбор плодов производят в три-четыре приема.

Плоды убираются в виде 10—15-дневных завязей. Они достигают к этому времени 12—20 см в длину (150—200 г). Кожица плода в момент уборки должна иметь зеленовато-белый цвет и быть достаточно мягкой.

Переросшие плоды легко грубеют и теряют вкусовые качества.

Для получения семян на кусте оставляют из первого сбора один плод. Последующие сборы на этом кусте продолжают обычным порядком.

Автор А. М. Сергеев. Редакторы: Н. И. Багриков
и А. А. Соколов,

ИВГИЗ. 1943 г. Подписано к печати 2/IV 1943 г. КЕ 19487. Печ. л. 1/4. Уч.-изд. л. 0,23. В печ. л. 38016 тип. зн. Тираж 3000 экз. Цена 10 коп.

Типография издательства Ивановского облсовета депутатов трудящихся. Типографская, 4. Заказ № 1764.



